

## PARLATORIA (*Parlatoria oleae*)

Es una plaga ampliamente distribuida, destacando la Cuenca mediterránea, próximo Oriente, Asia Central, India y América.

### DESCRIPCIÓN

Las larvas son de forma oval y color violeta oscuro. Su tamaño es reducido, de 0,3 mm aproximadamente.

Los adultos son dimórficos. La hembra presenta un escudo circular color gris de unos 2 mm. Sobre este escudo el exuvio queda de forma excéntrica. Un carácter taxonómico es que al levantar el escudo la hembra presenta una forma pentagonal y de color violeta. En cuanto al macho su escudo es casi rectangular y blanco grisáceo. Su exuvio es amarillo. Como rasgo distintivo destacar la presencia de alas.

### BIOLOGÍA

En invierno predomina la forma adulta y sobre toda las hembras fecundadas. Estas hembras pueden poner unos 80 huevos sobre Marzo o Abril. Se suelen encontrar en tallos las hembras y en hojas los machos y preferiblemente al noroeste. Prefieren ambientes suaves y húmedos.

### DAÑOS

Al ser insectos chupadores produce daños evidentes, sobre todo en los frutos, donde se aprecia decoloración de la piel y deformaciones, reduciendo el aceite que pueda obtenerse.